

Vergoeding van farmacotherapie in de behandeling van overgewicht en obesitas

Na tenminste 1 jaar actieve GLI-deelname en blijven deelnemen aan de GLI

Inzet mogelijk bij <10% gewichtsverlies na 1 jaar GLI

LIRAGLUTIDE

Merknaam: Saxenda
(Artsenverklaring nodig)

SEMAGLUTIDE *

Merknaam: Wegovy
(Geen vergoeding, ook niet na volgen GLI)

Volwassenen (18 jaar en ouder):

- BMI > 35 + gewichtsgelateerde aandoening (GGR), zonder DM2 (GGR=HVZ, slaapapneu, artrose, vergrote buikomvang etc.)
- Nog niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie
- BMI > 40 en géén DM2 en nog niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie + GLI

- **Liraglutide injectie.** Pen bevat 18 mg liraglutide en levert doses van 0.6, 1.2, 1.8, 2.4 en 3.0 mg
- Aanbevolen dosering: 3 mg 1x per dag (0.5 ml)

- **Semaglutide injectie.** Pen bevat 2,4 mg semaglutide (pen met 4 doses van 0.25, 0.50, 1.0, 1.7 of 2.4 mg
- Aanbevolen dosering 1 mg 1x per week

Inzet mogelijk bij <5% gewichtsverlies na 1 jaar GLI

NALTREXON-BUPROPION (N-B)

Merknaam: Mysimba
(Artsenverklaring nodig)

Volwassenen (18 jaar en ouder):

- BMI > 30 of
- BMI > 27 + gewichtsgelateerde aandoening (zoals DM2, HVZ-risico etc.)
- Nog niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie

- **Tablet** met gereguleerde afgifte, bevat 8 mg NaltrexonHCL (N) en 90 mg Bupropion- HCL (B)
- Aanbevolen dosering 2x daags 2 tabletten bij de maaltijd

Liraglutide en N-B moeten gedurende 4 weken worden opgebouwd tot maximaal verdraagbare dosis. Semaglutide gedurende 17 weken, [zie tabel](#).

Schrijf de medicatie niet voor bij patiënten > 75 jaar en tijdens zwangerschap of lactatie

Stopregel: i.v.m. geen te verwachten effect van medicijn: de behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik het aanvankelijke gewicht niet met ten minste **5%** is afgenomen bij matig verhoogd GGR en **10%** bij ernstig verhoogd GGR. Bij Naltrexon/Bupropion na 4 maanden.

Vragen en antwoorden over de vergoeding van farmacotherapie bij overgewicht en obesitas. Versie 1 oktober 2025 ZN en PON

Let op: Belangrijkste contra-indicaties en interacties